

Antal deltagande organisationer uppdelat på de tre åren är enligt följande;

2008 – 33 st

2009 – 47 st

2010 – 44 st


Allmänt kan man säga att det på alla indikatorerna (där vi har data för alla tre åren) ser likadant ut;

2008 bra resultat dvs att man arbetar med indikatorerna i stor utbredning,

2009 nedgång i arbetet

2010 början till uppgång

1.1 Preventiva program tillämpas angående tobak




2008: Knappt 70 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2009: Ungefär 50 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.


2010: Strax över 50 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

1.1.1 Preventiva program tillämpas angående tobaksfri i samband med operation



2010: Strax över 30 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

1.2 Preventiva program tillämpas angående alkohol




2008: Knappt 30 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2009: Ungefär 15 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.


2010: Strax över 20 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

1.2.1 Preventiva program tillämpas angående riskbruk



2010: Strax över 10 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

1.3 Preventiva program tillämpas angående mat




2008: Strax över 20 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2009: Knappt 20 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.


2010: Strax över 20 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

1.3.1 Preventiva program tillämpas angående undernäring på sjukhus



2010: Strax över 20 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

1.4 Preventiva program tillämpas angående fysisk aktivitet




2008: Strax över 50 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2009: Strax över 30 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.


2010: Strax över 40 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

1.4.1 Preventiva program tillämpas angående FaR



2010: Strax över 20 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2.1 Stödsystem för systematisk uppföljning finns för tobak




2008: Knappt 50 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2009: Strax över 40 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.


2010: Ungefär 50 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2.1.1 Stödsystem för systematisk uppföljning tillämpas för tobaksfri i samband med operation



2010: Knappt 20 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2.2 Stödsystem för systematisk uppföljning finns för alkohol




2008: Strax över 20 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2009: Knappt 20 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.


2010: Knappt 20 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2.2.1 Stödsystem för systematisk uppföljning tillämpas för riskbruk



2010: Strax över 10 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2.3 Stödsystem för systematisk uppföljning finns för mat




2008: Knappt 20 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2009: Strax över 10 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.


2010: Knappt 20 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2.3.1 Stödsystem för systematisk uppföljning tillämpas för undernäring på sjukhus



2010: Knappt 20 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2.4. Stödsystem för systematisk uppföljning finns för fysisk aktivitet




2008: Knappt 30 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2009: Strax över 30 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2010: Knappt 30 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.


2.4.1 Stödsystem för systematisk uppföljning tillämpas för FaR



2010: Strax över 30 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

3. Metoder tillämpas för att stimulera och tillvarata patientens kraft och initiativ i arbetet för sin egen hälsa (2008-2009).

Vårdgivaren ger systematiskt stöd för att förbättra egenupplevd hälsa (2010)




2008: Knappt 70 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2009: Ungefär 65 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.


2010: Knappt 60 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

4. Resultat av mätning av hälsorelaterad livskvalitet används för verksamhetsutveckling



2010: Knappt 10 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

5. Aktiv kunskapsförmedling bedrivs




2008: Strax över 50 % svarar med svaret JA.

2009: Strax över 30 % svarar med svaret JA.

2010: Knappt 50 % svarar med svaret JA.

6. Utvecklade samverkansformer för folkhälsoarbete finns på lokal/regional nivå




2008: Ungefär 45 % svarar med svaret JA.

2009: Knappt 40 % svarar med svaret JA.


2010: Ungefär 45 % svarar med svaret JA.

6.1 Skaderegistrering bedrivs och utgör grund för skadepreventivt arbete i samarbete med kommuner etc



2010: Ungefär 35 % svarar med svaret JA.

7. Organisationen följer en dokumenterad plan för att skapa hälsofrämjande arbetsplats (2008-2009). Stödstrukturer finns för utveckling av en hälsofrämjande arbetsplats (2010)




2008: Knappt 70 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2009: Ungefär 60 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2010: Knappt 80 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

**8.1 För medarbetare bedriver organisationen systematiskt friskvård (2008-2009).
Stöd finns för medarbetarna att förbättra/behålla sina levnadsvanor - friskvård (2010)**




2008: Knappt 90 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2009: Ungefär 90 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2010: Knappt 90 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

**8.2. För medarbetare bedriver organisationen systematiskt tobaksprevention (2008-2009).
Stöd finns för medarbetarna att förbättra/behålla sina levnadsvanor - tobaksprevention (2010)**




2008: Knappt 60 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2009: Strax över 70 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2010: Ungefär 70 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

8.3 För medarbetare bedriver organisationen systematiskt alkoholprevention (2008-2009). Stöd finns för medarbetarna att förbättra/behålla sina levnadsvanor - alkoholprevention (2010)




2008: Knappt 70 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

2009: Strax över 20 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.


2010: Ungefär 45 % arbetar med denna indikator till minst 50 %.

9. Mätbara mål om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete finns i vårdgivarens/vårdorganisationens ledningssystem



2010: Knappt 90 % svarar med svaret JA.

10. Det finns en styrgrupp till stöd för HFS (2008-2009).
Det finns en styrgrupp/motsv till stöd för det hälsoinriktade arbetet (2010)




2008: Ungefär 90 % svarar med svaret JA.

2009: Strax över 70 % svarar med svaret JA.


2010: Strax över 80 % svarar med svaret JA.

11. Verksamheten (eller delar av den) får särskild ersättning för det hälsoinriktade arbetet



2010: Knappt 60 % svarar med svaret JA.

M2. Har resultatet från förra årets indikatoruppföljning bidragit till verksamhetsutveckling inom organisationen?



2008: Knappt 10 % svarar med svaret Ja i hög grad/Ja ganska mycket.

2009: Ungefär 2 % svarar med svaret Ja i hög grad/Ja ganska mycket.

2010: Ungefär 5 % svarar med svaret Ja i hög grad/Ja ganska mycket.